

Viernes 13 de agosto del 2010

SOCIEDAD

[Volver](#)

SALUD

Rimonabant, un medicamento para perder peso, acarrea problemas psiquiátricos

Una investigación revela que la medicina aumenta el riesgo de desarrollar graves problemas psiquiátricos, y que en algunos pacientes se dieron varios casos de suicidio.

Efe 13/8/2010 16:48 h

Una reciente investigación revela que el medicamento para perder peso Rimonabant, aumenta el riesgo de desarrollar graves problemas psiquiátricos, hasta el punto de que se dieron varios casos de suicidio entre los pacientes sometidos a este fármaco.

La investigación, llamada CRESCENDO (The Comprehensive Rimonabant Evaluation Study of Cardiovascular Endpoints and Outcomes trial), se concibió inicialmente para averiguar si la ingesta de este medicamento aumentaba el riesgo de problemas cardiovasculares, según la publicación científica «The Lancet».

CRESCENDO fue elaborado por profesionales del Scripps Translational Science Institute de La Jolla, en California (EEUU), y de Academic Medical Center de Amsterdam (Países Bajos).

Rimonabant funciona mediante el bloqueo de los receptores cannabinoid-1 del cerebro, lo que reduce el apetito y, por tanto, la ingesta de comida y la obesidad, además de corregir anomalías en el metabolismo como exceso de triglicéridos, de colesterol o la rápida absorción de la glucosa por la sangre.

Para el estudio, se analizaron los casos de 974 hospitales en 42 países diferentes, que afectaron a 18.695 pacientes que previamente habían manifestado o aumentado el riesgo de enfermedades vasculares.

Se seleccionaron al azar los pacientes que serían sometidos al tratamiento de Rimonabant y aquellos a los que se les suministraría un placebo, para comprobar, en principio, el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, bien por infarto de miocardio o por derrame cerebral.

En noviembre del 2008, después de 13 meses, los ensayos clínicos tuvieron que ser suspendidos por las preocupación de las autoridades sanitarias de tres países donde se habían dado varios casos de suicidios entre los individuos que habían recibido Rimonabant en los ensayos clínicos o que lo habían adquirido en farmacias.

Sin embargo, en CRESCENDO, el ratio de suicidio fue mucho más bajo en comparación, ya que solo se suicidó un 0,04% de los pacientes que tomaron Rimonabant y un 0,01% de a los que se les suministraba el placebo.

El porcentaje de pacientes que desarrollaron enfermedades cardiovasculares fue del 3,9% (364 casos) entre aquellos que tomaban Rimonabant y del 4% (375 casos) entre los que ingerían el placebo.

Sin embargo, los pacientes sometidos a Rimonabant presentaron un 33 por ciento más de probabilidades de desarrollar problemas gastrointestinales, frente al 22% del grupo del placebo; un 32% más de padecer patologías neuropsiquiátricos (frente al 21% del otro grupo) y un 2,5% de ser víctima de otros problemas psiquiátricos (frente al 1,3% de los que tomaban el placebo).

Según los autores del estudio, «no hay evidencias suficientemente probadas que demuestren que Rimonabant deriva en problemas cardiovasculares, pero sí están claros sus efectos como inductor de problemas neuropsiquiátricos».

Debido a esto, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó a partir de octubre del 2008, cuando se produjeron los primeros suicidios, no prescribir a sus pacientes este fármaco, mientras que el organismo equivalente en EE.UU., la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos (FDA) nunca llegó a aprobar el uso del medicamento.



© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Comercializa publicidad local:

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) Comercializa publicidad nacional:

Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.